



კონტაქტების დადგენა

Contact tracing



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ტრენინგის თემები:

1. SARS-CoV2 მოკლე დახასიათება;
2. ინფექციის გადაცემის გზები;
3. ინფექციის ინკუბაციური პერიოდი;
4. COVID19-ის კლინიკური ნიშნები;
5. კონტაქტების დადგენა/მოძიება;
6. COVID19-ის შემთხვევის განსაზღვრა;
7. კონტაქტის განსაზღვრა;
8. მძიმე შემთხვევების ადრეული იდენტიფიცირება;
9. კონტაქტების მოძიების ფორმა.

SARS-CoV2-ის მოკლე დახასიათება

SARS-CoV აღწერილ იქნა 2003 წელს, ჩინეთში, ერთჯერადი ეპიდემიის სახით, რამაც გამოიწვია 700-ზე მეტი სიკვდილი, ფილტვის ხელოვნური ვენტილაციის 20-30%-იანი საჭიროებით და 10%-იანი ლეტალობით, განსაკუთრებით პაციენტებში თანარსებული დაავადებებით.

MERS-CoV პირველად იქნა აღმოჩენილი 2012 წელს, მას მსგავსი კლინიკური სურათი ჰქონდა, მაგრამ უფრო მაღალი ლეტალობა (36%). ეს ინფექცია კიდევ გრძელდება სპორადული შემთხვევების სახით.


ორივე ეს ინფექცია **ზოონოზურია**.



საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

SARS-CoV2-ს ფიზიკოქიმიური თვისებები ბოლომდე არ არის გარკვეული, მაგრამ ითვლება, რომ ის მგრძნობიარეა ულტრაიისფერი გამოსხივების და გათბობის მიმართ.

ახალი კორონავირუსი (COVID-19) მსუბუქი, გაციების (გრიპის) მსგავსი დაავადებაა. COVID-19 პირველად გამოჩნდა 2019 წლის დეკემბერში, ჩინეთში, ვუჰანის პროვინციაში.



ინფექციის გადაცემის გზები

ინფექცია გადაეცემა წვეთოვანი და კონტაქტური გზით. ნაჩვენებია, რომ SARSCoV-2 ასევე შეიძლება გადაეცეს აეროზოლის საშუალებით და ფეკალურ-ორალური გზით. ვირუსი ყველაზე გადამდებია სიმპტომების დაწყებიდან **პირველი სამი დღის განმავლობაში**, თუმცა შესაძლებელია გადაცემა სიმპტომების გამოვლენამდე **ორი დღით ადრე** (პრე-სიმპტომური გადაცემა) და დაავადების შემდგომ ეტაპებზეც.

ინფექციის გადაცემის რისკი

ინდივიდიდან SARS-CoV-2-ით ინფიცირების რისკი განსხვავდება ექსპოზიციის ტიპისა და ხანგრძლივობის, პროფილაქტიკური ზომების გამოყენებისა და სავარაუდოდ, ცალკეული ფაქტორების მიხედვით.



ინფექციის ინკუბაციური პერიოდი

SARSCoV-2 ინფექციის ინკუბაციური პერიოდი 1–დან 14 დღემდეა, ძირითადად, 3–დან 7 დღემდე.

უმეტეს შემთხვევაში კლინიკური სიმპტომების გამოვლენა ხდება ექსპოზიციიდან 2 ან 3 დღეს.



COVID19ს კლინიკური ნიშნები


ხშირი სიმპტომები:

- ცხელება
- ხველა
- დაღლილობის შეგრძნება



ნაკლებად ხშირი სიმპტომები:

- სხეულის ტკივილი
- ყელის ტკივილი
- სიმპტომები კუჭნაწლავის მხრივ (ფაღარათი)
- კონიუქტივტი
- თავის ტკივილი
- გამონაყარი სხეულზე
- ყნოსვის და გემოს შეგრძნების დაკარგვა






კონტაქტების დადგენა/მოძიება

კონტაქტის მოძიება წარმოადგენს იმ ადამიანთა იდენტიფიკაციის, შეფასებისა და მხარდაჭერის პროცესს, რომლებსაც შესაძლო შეხება/კონტაქტი ჰქონდათ COVID-19-ით ინფიცირებულთან, რათა თავიდან იქნას აცილებული ვირუსის შემდგომი გავრცელება.

- 1) კონტაქტის მოძიება
- 2) ინფიცირებულებთან კონტაქტის დამდგენის აპლიკაციები
- 3) აქტიური შემთხვევების პოვნა
- 4) სკრინინგი სასაზღვრო პუნქტებზე
- 5) საზოგადოებრივ დონეზე მონიტორინგი (CBS)
- 6) ცხელი ხაზი



COVID19-ის შემთხვევის განსაზღვრა

შესაძლო შემთხვევა:

ა) პირი მწვავე რესპირატორული დაავადებით (ცხელება და რესპირატორული დაავადების სულ მცირე ერთი ნიშანი / სიმპტომი, მაგ. ხველა, სუნთქვის გაძნელება) და მოგზაურობის ისტორიით ან საცხოვრებელის ადგილმდებარეობით, რომლის თემშიც დაფიქსირდა COVID-19-ის შემთხვევები, სიმპტომების გამოვლენამდე 14 დღით ადრე;

ან

ბ) პირი მწვავე რესპირატორული დაავადებით, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა COVID-19-ის დადასტურებულ ან შესაძლო შემთხვევასთან სიმპტომების გამოვლენამდე 14 დღით ადრე;

ან

გ) პირი მწვავე რესპირატორული დაავადებით (ცხელება და რესპირატორული დაავადების სულ მცირე ერთი ნიშანი / სიმპტომი, მაგ. ხველა, სუნთქვის გაძნელება და რომელიც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას), რომელსაც არ გააჩნია სხვა ალტერნატიული დიაგნოზი, რაც სრულად ხსნის მის კლინიკურ მონაცემებს.

COVID19-ის შემთხვევის განსაზღვრა

სავარაუდო შემთხვევა:

- ა) საექვო შემთხვევა, რომლის შემთხვევაშიც COVID-19-ის ტესტი არასარწმუნოა;
ან
- ბ) საექვო შემთხვევა, რომლის ტესტირებაც ვერ განხორციელდა რაიმე მიზეზით.

დადასტურებული შემთხვევა:

პირი, ლაბორატორიულად დადასტურებული COVID-19-ის ინფექციით, კლინიკური ნიშნებით და სიმპტომებით, ან მათ გარეშე.

კონტაქტის განსაზღვრვა

კონტაქტი არის პირი, რომელსაც ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე ტიპის შეხება ჰქონდა COVID-19-ის სავარაუდო ან დადასტურებული შემთხვევის სიმპტომების დაწყებიდან **2 დღით ადრე 14 დღემდე**:

1. COVID-19-ით ინფიცირებულთან 1 მეტრის სიახლოვეში ყოფნა 15 წუთის განმავლობაში;
2. პირდაპირი ფიზიკური კონტაქტი COVID-19-ით შესაძლო ან დადასტურებულ ინფიცირებულთან;
3. COVID-19-ით შესაძლო ან დადასტურებულ ინფიცირებულ პირზე პირდაპირ ზრუნვა პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის (PPE) გარეშე;



მძიმე შემთხვევების ადრეული იდენტიფიცირება

თუ პირს COVID19-ის საგანგაშო ნიშნები უვლინდება, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით 112-ს.

საგანგაშო ნიშნებს მიეკუთვნება:

- სუნთქვის გაძნელება ან ქოშინი;
- პერსისტიული ტკივილი ან ზეწოლა გულმკერდის არეში;
- მწვავედ განვითარებული ცნობიერების დარღვევა ან გამოფხიზლების შეუძლებლობა;
- ტუჩების ან სახის მოლურჯო შეფერილობა.

*საგანგაშო სიმპტომები არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ ჩამონათვალით.



საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც შეტანილ უნდა იქნას კონტაქტების მოძიების ფორმებში:

მინიმალური საჭირო მონაცემები:

- კონტაქტის იდენტიფიკაცია (ID)
- დემოგრაფიული ინფორმაცია
- კონტაქტის ტიპი
- ყოველდღიური დაკვირვების ნიშნები და სიმპტომები
- კონტაქტთან კავშირის დაკარგვა ან დაკვირვების შესაძლებლობის არქონა
- სიმპტომურობის შემთხვევაში განხორციელებული ქმედებები



მადლობა ყურადღებისთვის!

კითხვები?

